

Central Texas Colon and Rectal Surgeons

Instrucciones después de la escisión de una hemorroide externa trombosada

Un hemorroide externa trombosada es un coágulo que desarrolla en una vena por fuera del ano, o de una ruptura de tal vena con acumular de sangre bajo la piel. Qué ha sido hecho es hoy extirpar completamente la piel sobre el coágulo así como el coágulo él mismo. Es importante darse cuenta de que usted no ha tenido un hemorrhoidectomy realizó en la oficina.

1. Tomará aproximadamente 7-10 días para la herida superficial para curar. No se alarme si sangra o si descarga ocurre durante este espacio de tiempo, como es normal.
2. Usted debe ir a casa y se acuesta inmediatamente por un período de 6-8 horas.
3. Quite el gasa la mañana siguiente.
4. Entonces tome un baño caliente durante 15-20 minutos. Después, toma un baño caliente dos veces al día por 1 semana y después de todas evacuaciones.
5. Aplique gasa 4x4 al área anal después de cada evacuación y el baño.
6. Mantenga intestinos que mueven diariamente. Tome 1 cucharón de polvo de Benefiber o equivalente en el agua o el jugo dos veces al día.
7. Tenga la prescripción llenó. Tome la medicina como escrito inmediatamente a llegar en casa. Acuéstese y permanezca allí hasta que usted tome su primer baño caliente.
8. Las instrucciones especiales:
 - No toma cualquiera sobre la aspirina contraria, Motrin, ni ibuprofen por dos semanas menos Tylenol.
 - No actividad ardua, esforzar, ni levantar se oponen más que 20lbs. por dos semanas.
 - Otro:
